

التساؤلات التي يطرحها الكيميائي

I أنشطة الكيميائي:

أنشطة الكيميائي متعددة ومتنوعة وذلك لكون لكيمياء فرع من فروع العلم يختص بدراسة تركيب المواد والتفاعلات التي تحدث بينها ، ولها دور مهم في عدة قطاعات كالصحة والنظافة والنقل والصناعة والبناء والبيئة وغيرها. نعرفنا في السنة الماضية على بعض هذه الأنشطة مثل تقنيات الإستخراج والفصل والتحليل الكروماتوغرافي وتصنيع بعض الأنواع الكيميائية.

II التساؤلات التي تطرح على الكيميائي:

- قد تطرح على الكيميائي عدة تساؤلات نذكر منها ما يلي:
- ما طبيعة تحول كيميائي ، سريع أم بطيء ؟
 - ما طبيعة تفاعل كيميائي محدود أم كلي ؟
 - ما منحى تطور مجموعة كيميائية؟
 - كيف يمكن التحكم في تطور مجموعة كيميائية؟
 - ما تركيب مجموعة كيميائية عند بداية أو عند نهاية التفاعل؟
 - كيف يمكن الرفع من مردود تفاعل كيميائي.
- من أجل ذلك يجب تعريف وتذكير بعض المفاهيم المكتسبة والمتعلقة بالقياسات التي ينجزها الكيميائي.

III تذكير لبعض المفاهيم المكتسبة والمتعلقة بالقياسات التي ينجزها الكيميائي.

1 مفهوم كمية المادة:

كمية المادة هو عدد المولات ويرمز إليه ب : n ويعبر عنه بالمول mol .
ومول من الدقائق يساوي N دقيقة متشابهة (N= 6,02.10²³ عدد أفوكادرو).

وبصفة عامة كمية مادة نوع كيميائي x (صلبا كان أو سائلا أو غازيا) تعطيه العلاقة التالية : $n(x) = \frac{m(x)}{M(x)}$

بحيث : m(x) : كتلة الجسم x ب (g).

M(x) : الكتلة المولية للجسم x ، ب : (g/mol).

n(x) : كمية مادة الجسم x ب : (mol).

بالنسبة للغازات يمكن استعمال العلاقة التالية كذلك : $n(x) = \frac{V(x)}{V_M}$

بحيث : V (x) : حجم الجسم x ب (L).

V_M : الحجم المولي للجسم x ، ب : (L/mol).

مثال 1) ما كمية المادة الموجودة في 0,6g من الكربون ؟

$$n(x) = \frac{m(x)}{M(x)} = \frac{6g}{12g \cdot mol^{-1}} = 0,05mol$$

مثال 2 : ما كمية المادة الموجودة في 7,2L من غاز ثنائي الكلور؟

$$n(x) = \frac{V(x)}{V_M} = \frac{7,2L}{24L \cdot mol^{-1}} = 0,3mol$$

2) الكتلة الحجمية والكثافة : (ا) الكتلة الحجمية:

الكتلة الحجمية لجسم هي كتلة الجسم لوحدة الحجم وتعطيهما العلاقة التالية :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

m : كتلة الجسم . و V : حجم الجسم .

ووحدة الكتلة الحجمية في النظام العالمي للوحدات هي : kg / m³ ويمكن التعبير عنها كذلك ب : g / cm³ .
مثال : الكتلة الحجمية للماء:

$$\rho = 1g / cm^3$$

وبما أن : 1g = 10⁻³ kg و : 1cm³ = 10⁻⁶ m³

$$\rho = 1g/cm^3 = \frac{10^{-3}kg}{10^{-6}m^3} = 10^3kg/m^3$$

(ب) الكثافة:

كثافة سائل x تساوي حاصل قسمة كتلته الحجمية على الكتلة الحجمية للماء : $d(x) = \frac{\rho(x)}{\rho_{eau}}$

ملحوظة: بما أن $\rho_{eau} = 1g/cm^3$

إذن: $d(x) = \rho(x)$ كثافة سائل تساوي كتلته الحجمية (من حيث المقدار).

وبالنسبة للغازات ، الكثافة تعطى العلاقة التالية : $d(x) = \frac{M(x)}{29}$ **والكثافة مقدار بدون وحدة .**

$M(x)$: الكتلة المولية للغاز.

: الغاز أثقل من الهواء . $d > 1$

: الغاز أخف من الهواء . $d < 1$

مثال: بالنسبة لغاز ثنائي الكلور : $d(Cl_2) = \frac{M(Cl_2)}{29} = \frac{71}{29} = 2,45$ أثقل من الهواء .

بالنسبة لغاز الهيليوم : $d(He) = \frac{M(He)}{29} = \frac{4}{29} = 0,14$ أخف من الهواء .

(3) التركيز المولي لجسم مذاب: التركيز المولي الفعلي لنوع كيميائي :

التركيز المولي لجسم مذاب: هو عدد مولات المذاب في لتر من المحلول وتقاس بوحدة mol/L ، ويرمز إليه ب C .

n . عدد المولات (أي كمية المادة). ب: mol

$$C = \frac{n}{V}$$

V : حجم المحلول ب : L

C : التركيز المولي ب: mol/l .

ويعبر عن التركيز **المولي الفعلي** لنوع كيميائي x بوضع النوع بين قوسين $[x]$.

مثال 1 : حُضِرَ محلول بإذابة (4,39g) من كلورور الصوديوم NaCl في كمية من الماء للحصول على محلول حجمه 250mL . احسب :

أ. تركيز NaCl ب المول/لتر .
ب. تركيز الأيونات الناتجة في الماء .


الحل :

أ.

$$C = \frac{n}{V} = \frac{m}{M.V} = \frac{4,39g}{58,5g/mol \cdot 0,25L} = 0,3mol/L$$

ب. تركيز الأيونات .

لنكتب معادلة التفكك :



لأن التفكك كامل (كلي) .

ومنه : $[Na^+] = [Cl^-] = 0,3mol/L$

(4) علاقة التخفيف:

ليكن C_i تركيز المحلول المراد تخفيفه و V_i حجمه ، C_f تركيز المحلول المخفف و V_f حجمه .
تكتب علاقة التخفيف كما يلي .

$$C_i \cdot V_i = C_f \cdot V_f$$

$$F = \frac{C_{\text{initiale}}}{C_{\text{finale}}} = \frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{initial}}}$$

معامل التخفيف

مثال: نذيب 16,6g من يودور البوتاسيوم KI في 50mL من الماء.

- (1) أوجد التركيز C لهذا المحلول.
 - (2) نأخذ 20mL من هذا المحلول ونضيف إليها 80mL من الماء الخالص .
 - (3) أوجد التركيز C' للمحلول المحصل عليه.
 - (3) اوجد قيمة معامل التخفيف.
- نعطي:

$$M(KI) = 166 \text{ g/mol}$$

تصحيح:

- (1) كمية المادة الموجودة في 16,6g من يودور البوتاسيوم KI هي:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{16,6g}{166g/mol} = 0,1mol$$

إذن تركيز المحلول:

$$c = \frac{n}{V} = \frac{0,1mol}{50 \cdot 10^{-3} L} = 2mol/L$$

(2)

بتطبيق علاقة التخفيف: $C \cdot V = C' \cdot V'$ مع $V' = V + V_e = 20 + 80 = 100mL$


$$C' = \frac{C \cdot V}{V'} = \frac{2mol/L \cdot 20 \cdot 10^{-3} L}{100 \cdot 10^{-3} L} = 0,4mol/L$$

(3) معامل التخفيف:


$$F = \frac{c}{c'} = \frac{2mol/L}{0,4mol/L} = 5$$

4) طريقة موازنة معادلة كيميائية:

يجب أن تكون المعادلة الكيميائية دائما متوازنة من حيث عدد الذرات و من حيث عدد الشحنات الكهربائية إذا وجدت فيها.
وازن المعادلة الكيميائية التالية:



لتكن : a- b -c -d : المعاملات التناسبية لهذه المعادلة :




- (1) موازنة ذرات الكربون : $a=c$
- (2) موازنة ذرات الأوكسجين : $a+4b=2c$
- (3) موازنة ذرات الحديد : $3b=d$

نضع : $a=1$:
من خلال المعادلة (1) $c=1$


من خلال المعادلة (2) $b = \frac{1}{4} \iff 1+4b=2$

من خلال المعادلة (3) : $d = \frac{3}{4}$

إذن لدينا:




وتفاديا للكسر نضرب الكل في : 4



وهكذا أصبحت المعادلة متوازنة.

مثال:وازن المعادلة التالية:



5) معادلة الحالة للغازات الكاملة:

(أ) تعريف:

$$P.V = n.R.T$$

T: درجة الحرارة المطلقة ب: k الكيلفين.

V: حجم الغاز ب: m^3 .

N: كمية المادة بالمول mol .

R: ثابتة الغازات الكاملة ب: $\text{J} / \text{mol.K}$.

$$1\text{L} = 10^3 \text{mL} = 10^3 \text{cm}^3 \quad \text{ملحوظة:}$$

$$1\text{cm}^3 = 10^{-3} \text{L}$$

$$1\text{m}^3 = 10^3 \text{L} = 10^6 \text{cm}^3$$

$$1\text{cm}^3 = 10^{-6} \text{m}^3$$

$$R = \frac{P.V}{n.T} \rightarrow \frac{\text{Pa.m}^3}{\text{mol.K}} = \frac{\text{N.m}^{-2}.\text{m}^3}{\text{mol.K}} = \frac{\text{N.m}}{\text{mol.K}} = \text{J} / \text{mol.K}$$

(ب) تطبيق:

تحتوي قارورة على حجم $V = 1\text{dm}^3$ من غاز ثنائي الأوكسجين تحت ضغط $P = 1,5.10^6 \text{Pa}$ عند درجة الحرارة 25°C .

(1) احسب كمية مادة ثنائي الأوكسجين الموجود في القارورة؟

(2) احسب الحجم المولي في ظروف التجربة.

(3) أوجد كمية مادة ثنائي الأوكسجين الموجود في القارورة.

(4) ما حجم ثنائي الأوكسجين الذي يمكن الحصول عليه عند ضغط $P = 10^5 \text{Pa}$ ودرجة الحرارة 20°C والحجم المولي

$$V_M = 24\text{L} / \text{mol}$$

$$M(\text{O}_2) = 32\text{g} / \text{mol} \quad , \quad R = 8,314\text{J} / \text{mol.K} \quad \text{نعطي:}$$

$$n_{(\text{O}_2)} = \frac{P.V}{R.T} = \frac{1,5.10^6 \text{Pa} \cdot 10^{-3} \text{m}^3}{8,314\text{Jmol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15\text{K}} \approx 0,6\text{mol} \quad \Leftarrow \quad P.V = n.R.T \quad \text{(1) بتطبيق العلاقة:}$$

$$V_M = \frac{V_{\text{O}_2}}{n_{(\text{O}_2)}} = \frac{10^{-3} \text{L}}{0,6\text{mol}} \approx 1,7.10^{-3} \text{L} / \text{mol} = 1,7\text{cm}^3 / \text{mol} \quad \Leftarrow \quad n_{(\text{O}_2)} = \frac{V_{(\text{O}_2)}}{V_M} \quad \text{(2) لدينا:}$$

وبذلك تتضح أهمية الضغط المرتفع على غاز الأوكسجين حيث أصبحت مول من الغاز تشغل حجما صغيرا أقل من 2cm^3 .

بينما عند نفس درجة الحرارة وعند الضغط الجوي 101300Pa (الذي هو أقل من الضغط السابق بحوالي 14,8 مرة) يكون

الحجم المولي مساويا ل: $24,5\text{L} / \text{mol}$.

$$m(\text{O}_2) = n(\text{O}_2) \cdot M(\text{O}_2) = 0,6\text{mol} \cdot 32\text{g} / \text{mol} = 19,2\text{g} \quad \Leftarrow \quad n(\text{O}_2) = \frac{m(\text{O}_2)}{M(\text{O}_2)} \quad \text{(3)}$$

$$\Leftarrow \quad P.V = n.R.T \quad \text{(4) بتطبيق العلاقة:}$$

$$V = \frac{n.R.T}{P} = \frac{0,6\text{mol} \cdot 8,314\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 293,15\text{K}}{10^5 \text{Pa}} = 0,0146\text{m}^3 = 14,6\text{dm}^3$$

6) جدول التقدم:



لتكن معادلة التفاعل:

(أ) تعريف:

